

INTERAKTIONSOÖVERSIKT

Lynkuet
elinzanetant



Exempel på vanliga CYP3A4 -hämmare¹ och Lynkuet (för CYP3A4-inducerare förväntas ingen kliniskt relevant interaktion)

Starka CYP3A4-hämmare	Måttliga CYP3A4-hämmare	Svaga CYP3A4-hämmare
• Itrakonazol, ketokonazol, posakonazol, vorikonazol (antimykotika) • Klaritromycin (antibiotika) • Kobicistat, ritonavir, elvitegravir, lopinavir, tipranavir (antivirala läkemedel) • Idelalisib, tukatinib (onkologiläkemedel) • Ribociklib 600 mg (CKD 4/6-hämmare)* • Grapefruktjuice	• Aprepitant (antiemetika) • Ciprofloxacin, erytromycin (antibiotika) • Ciklosporin (immunsuppressivt läkemedel) • Dronedaron (antiarytmika) • Flukonazol (antimykotika) • Fluvoxamin (SSRI) • Ribociklib 400 mg-dos (CDK 4/6-hämmare)* • Krizotinib, imatinib (onkologiläkemedel) • Verapamil (kalciumantagonist)	Ingen dosjustering krävs för svaga CYP3A4-hämmare.
 Rekommenderas inte² 	 Reducera dygnsdosen till 1 kapsel (60mg)² 	 Ingen dosjustering krävs² 

CYP3A4-hämmare minskar clearance av elinzanetant, vilket leder till högre exponering.²

* CDK 4/6-hämmarna abemaciclib och palbociclib förväntas inte ge kliniskt relevanta interaktioner³

Referenser:

1. Pinkerton et al. "Elinzanetant for the Treatment of Vasomotor Symptoms Associated With Menopause: OASIS1 and 2 Randomized Clinical Trials." JAMA, vol.332, 161343–1354.22Aug.2024,Supplement1.

2. Lynkuet produktresumé, 06/2026

3. Brennan et al., Elinzanetant in Breast Cancer Care: Potential Drug–Drug Interaction Profile With Targeted Systemic Therapies. ESMO Breast Cancer 2026 Congress Poster. Bayer AG, 2026

Lynkuet (elinzanetant) 60 mg mjuka kapslar ATC-kod: G02CX07 Rx, EF. **Indikation:** Lynkuet är avsett för behandling av måttliga till svåra vasomotoriska symtom (VMS): förknippade med menopaus eller orsakade av adjuvant endokrin behandling relaterad till bröstcancer. **Kontraindikationer:** Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Känd eller misstänkt graviditet. **Varningar:** Hämmare av cytokrom P450-isoformen 3A4 (CYP3A4) kan minska clearance av elinzanetant vilket leder till högre exponering. Samtidig användning av elinzanetant med starka CYP3A4-hämmare rekommenderas inte. Vid samtidig användning med måttliga CYP3A4-hämmare ska dosen av elinzanetant sänkas. Samtidig användning av elinzanetant och MHT med östrogener har inte studerats, och därför rekommenderas inte samtidig användning. Lokal vaginal östrogenbehandling kan användas. **Biverkningar:** VMS associerat med menopaus: Vanliga:

ysrel, huvudvärk, somnolens, magsmärtor, diarré, utslag, muskelkramp, trötthet. Mindre vanliga: ökat ALAT, ökat ASAT, ljuskänslighetsreaktioner. VMS orsakade av AET: Mycket vanliga: trötthet. Vanliga: depression, nedstämdhet, yrsel, somnolens, vertigo, diarré, ökat ALAT, alopeci, muskelkramp. Mindre vanliga: ökat ASAT, ljuskänslighetsreaktioner. **Datum för senaste översyn av SPC:** 06/2026. För ytterligare information, pris samt före förskrivning vänligen läs produktresumé på fass.se. Kontaktppgifter: www.bayer.se
▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket.
PP-LNK-SE-0057-2 09.2026