



jaydess®

13.5 MG LEVONORGESTREL

Till dig som fått förskrivet

Jaydess®



Innehåll

Vad är Jaydess®?

Effekt

Påverkan på kroppen

Hur sätts Jaydess® in?

Trådarnas funktion

Skydd mot graviditet

Kontakta din barnmorska/
läkare, om...

Sexliv

Blödningsmönster

Sexuellt överförbar sjukdom

Symtom på graviditet

Vanliga frågor

Biverkningarna

Det här är Jaydess®

Vi hoppas att denna broschyr ska ge dig svar på dina frågor och funderingar kring Jaydess®. Ta även noga del av informationen i bipacksedeln som medföljer förpackningen.



Vad är Jaydess®?

Jaydess® är ett inlägg som består av en hormonkapsel som är fastsatt på en T-formad, vävnadsvänlig stomme av plast. Inlägget är 30 mm långt och sätts in i livmodern med hjälp av en införingshylsa.

Jaydess® är den minsta 3-åriga hormonspiralen som finns tillgänglig och innehåller en låg dos hormon. Din barnmorska/läkare sätter in den i livmodern, där den skyddar mot oönskad graviditet. Genom att långsamt frisätta en låg dos av gulkroppshormonet levonorgestrel (i snitt 6 mikrogram) lokalt i livmodern, dygn efter dygn under 3 år, behöver du inte tänka på daglig, veckovis eller månatlig administrering.

Hur fungerar Jaydess®?


När Jaydess® sitter på plats i livmodern avges dagligen en låg dos av hormonet levonorgestrel långsamt och kontinuerligt i livmodern och skyddar mot graviditet på tre sätt.

1. Jaydess gör slemmet i livmoderhalsen tjockt så att spermernas passage försvåras.
2. Jaydess påverkar livmoderslemhinnans tillväxt. Slemhinnan blir tunn och ofruktbar.
3. Själva inlägget bidrar också till en ogynnsam miljö för spermerna i livmoder och äggledare. Spermernas rörelseförmåga påverkas och befruktning förhindras.



Hur kommer Jaydess® påverka min kropp?

Jaydess® verkar i huvudsak lokalt i livmodern. Den avger levonorgestrel i livmodern och endast små mängder av hormonet kommer ut i blodbanan. Levonorgestrel är ett vanligt förekommande hormon i preventivmedel. Jaydess® påverkar inte ägglossningen hos merparten av kvinnorna. Det innebär att äggstockarnas egen produktion av östrogen bibehålls.



Hur sätts Jaydess® in?

När du bestämt dig för Jaydess® kan den sättas in vid nästa besök hos din barnmorska/läkare. Vid en gynekologisk undersökning för man in Jaydess® med ett flexibelt insättningsrör. När Jaydess® är insatt klipps kontrolltrådarna till en längd av 2–3cm.

De flesta kvinnor tycker att insättningen är relativt enkel, men en del kan uppleva lite smärta och yrsel under insättningen. Om du har svår smärta eller om smärtan inte avtar inom några veckor efter insättningen bör du kontakta din barnmorska/läkare.



Vad har trådarna som sitter på Jaydess® för funktion?

Trådarna på Jaydess® är till för att barnmorska/läkare ska kunna dra ut den. Din barnmorska/läkare kommer att berätta hur du kan känna efter att trådarna finns på plats. Genom att känna på trådarna kan du själv kontrollera att Jaydess® fortfarande finns på plats i livmodern och ger dig ett effektivt preventivt skydd. Har du övriga frågor om trådarna, tveka inte att tala med din barnmorska/läkare.

Hur snart skyddar Jaydess® mot graviditet?

Om du sätter in Jaydess® inom 7 dagar från mensens första dag så ger Jaydess® omedelbart ett effektivt skydd mot graviditet i upp till

3 år. Om Jaydess® sätts in under annan del av menstruationscykeln så bör du skydda dig extra med kondom de första 7 dagarna.

Med Jaydess® behöver du inte tänka på att ta preventivmedel dagligen, varje vecka eller varje månad.

Du bör kontakta barnmorska/läkare om något av följande uppstår:

- Du har svår smärta eller rikliga blödningar efter insättningen eller om smärtan eller blödningen fortsätter mer än 5 veckor.
- Du tror att du är gravid.
- Du har ihållande buksmärta, feber eller onormal flytning.
- Du/din partner känner smärta eller obehag under samlag.
- Du får ett förändrat blödningsmönster (t ex om du har liten eller ingen menstruation och den plötsligt blir ihållande eller riklig).
- Du får andra medicinska problem, t ex migrän/mycket svår huvudvärk, plötsliga synproblem, gulsot eller högt blodtryck.

Kommer Jaydess® att påverka mitt sexliv?

När Jaydess® är på plats i livmodern kommer inte du eller din partner känna av den under samlag.

Hur kommer Jaydess® påverka mitt blödningsmönster?

Du kommer att få mindre mensblödning, både i mängd blödning och i antal dagar du blöder varje månad. De första 3–6 månaderna efter att Jaydess® är insatt kan du ha stänklödning eller små blödningsar. Vissa kvinnor kan få längre eller rikligare blödningsar under denna period, men det innebär inte att du kommer att blöda varje dag. Det kan vara bra att skriva ner

hur du blöder så att du ser att det blir bättre vartefter.

Tala med din barnmorska/läkare om blödningsar fortsätter vara rikligare än normalt eller om du plötsligt blöder fler dagar än tidigare.

Hos vissa kvinnor försvinner mensens helt när de använder Jaydess®. Om du inte haft någon mensblödning de

senaste 6 veckorna och är orolig över en graviditet, gör ett graviditetstest. Om detta är negativt behöver du inte göra fler tester, såvida du inte har andra symtom som kan tyda på en graviditet (t ex illamående, trötthet eller spända bröst). Om din mensblödning upphör under tiden du använder Jaydess®, bör den komma tillbaka när Jaydess® tas ut.

Bör jag hålla koll på mitt blödningsmönster?

Då du troligen kommer att märka skillnad på din menstruationsblödning kan det vara bra att hålla koll på din blödning/stänklödning för att hjälpa dig och barnmorskan/läkaren att följa din erfarenhet med Jaydess®.

Om jag bestämmer mig för att skaffa barn?

Jaydess® skyddar mot graviditet i upp till 3 år, men du kan när som helst be din barnmorska/läkare att ta ut den. Du kan försöka bli gravid så snart din Jaydess® tagits ut. Majoriteten av kvinnorna i kliniska studier som önskade bli gravida efter att Jaydess® tagits ut, blev det inom 1 år, vilket är samma nivå som för kvinnor utan preventivmedel.

Att tänka på när du planerar graviditet

Livsmedelsverket rekommenderar ett intag av 400 µg folsyra varje dag från en månad innan befruktning och under åtminstone de 12 första graviditetsveckorna. Detta för att förebygga ryggmärksbråck hos barnet. Tillräcklig mängd folsyra är fortsatt viktig under hela graviditeten, främst för mammans blodbildning och fostrets utveckling (Livsmedelsverket 2022).

Vanliga frågor om spiral

Skyddar spiral mot sexuellt överförbara sjukdomar?

Nej. spiral används för att skydda mot oönskad graviditet och skyddar inte mot sexuellt överförbara sjukdomar, inklusive HIV och AIDS. Det är viktigt att du använder kondom för att skydda dig mot sexuellt överförbara sjukdomar.

Vad händer om jag får en sexuellt överförbar sjukdom?

Om du tror att blivit smittad med en sexuellt överförbar sjukdom när du använder Jaydess® ska du kontakta din barnmorska/läkare. Du bör undvika att ha samlag till dess att du träffat barnmorska/läkare.

Om jag blir gravid när jag använder spiral?

Risken att bli gravid när du använder spiral är mycket liten, men det kan dock hända. Att du inte får en menstruationsblödning när en hormonspiral är insatt betyder oftast inte att du är gravid. Om du inte får en menstruationsblödning som förväntat och har andra symtom som kan tyda på en graviditet (t ex illamående, trötthet, spända bröst) bör du dock genast kontakta barnmorska/läkare. Om du blir gravid så finns den en risk att graviditeten sitter utanför livmodern.

Nedanstående tecken och symtom kan tyda på en graviditet utanför livmodern:

- Din menstruation har upphört och plötsligt får du ihållande blödning och ont i magen.
- Du har svår eller ihållande smärta i nedre delen av buken.
- Du har normala graviditetssymtom men kan även blöda och känna dig yr.

Om du upplever något av ovan skall du genast kontakta barnmorska/läkare.

Kan jag använda spiral mellan barnafödande?

Ja, men tidigast 6 veckor efter förlossningen kan spiral sättas in och den ger då ett säkert graviditetsskydd. Du kan försöka bli gravid igen så snart din barnmorska/läkare tagit ut spiralen.

Kan jag använda spiral om jag inte fött barn?

Hormon- och kopparspiral kan rekommenderas till yngre kvinnor, även till dem som inte varit gravida. Erfarenheten av spiralanvändning är fortfarande begränsad bland de allra yngsta (tonåringar), men spiral kan efter individuell bedömning vara ett alternativ.

Kan jag använda tamponger när jag har spiral?

Ja, men var försiktig när du drar ut tampongen så att du inte kommer åt trådarna som är fästa i spiral.

Kan spiralen "ramla ut"?

Spiralen kan stötas ut delvis eller komplett. Om du tycker att din blödning återgår till de blödningar du hade innan du satte in den bör du kontrollera att den sitter på plats i livmodern. Får du oregelbundna blödningar efter att du haft regelbundna blödningar kan det vara ett tecken på att spiralen delvis stöts ut. Om spiralen stöts ut är du inte längre skyddad mot graviditet. Du bör då undvika samlag eller använda kondom och konsultera din barnmorska/läkare.

Vilka är de vanligaste biverkningarna med Jaydess®?

Som med alla läkemedel kan man uppleva vissa biverkningar med Jaydess®. Besvären är vanligen lindriga och försvinner oftast efter några månaders användning. Under användning av Jaydess® var de vanligaste biverkningar som kvinnor rapporterade i kliniska studier huvudvärk, buk- och bäckensmärta, acne/fet hy, förändringar i blödningsmönstret, cystor på äggstockarna, svamp i underlivet, slidkatarr, nedstämdhet, migrän, illamående, smärtsamma menstrua-

tioner, smärta/obehag i bröstet, utstötning av inlägget och flytningar. Om du har ytterligare frågor kan du läsa mer i bipacksedeln eller kontakta din barnmorska/läkare.

Orsakar spiral viktökning?

Varken hormon- eller kopparspiral orsakar viktökning.

Går det att se vilken sorts spiral det är när den sitter på plats i livmodern?

Sjukvårdspersonal kan via ultraljud eller röntgen se skillnad på de olika spiralerna. Skillnaden mellan hormonspiralerna är att på de mindre sitter en silverring (som är nickelfri).



jaydess®



PP-JAY-SE-0001-3 DEC 2022

Jaydess®, intrauterint inlägg, 13,5 mg levonorgestrel

Indikation: Antikonception. **Biverkningar:** Huvudvärk, buk/bäckensmärta, acne/fet hy och förändringar i blödningsmönstret. **Varningar/försiktighet:** Jaydess bör användas med försiktighet eller avlägsnas, efter konsultation med specialist, om något av följande tillstånd föreligger eller uppstår för första gången: mycket svår huvudvärk, fokal migrän med asymmetriskt synbortfall, gulsot, högt blodtryck, stroke eller hjärtinfarkt. Kvinnor som överväger att låta sätta in en Jaydess bör informeras om tecken och symtom samt på risken för ektopisk graviditet. Till kvinnor som inte fött barn är Jaydess inte ett förstahandsval eftersom den kliniska erfarenheten är begränsad. Vissa kvinnor som använder hormonella preventivmedel har rapporterat depression eller nedstämdhet. Vid humörförändringar ska du kontakta barnmorska eller läkare. Ta noga del av bipacksedeln.

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkan till Läkemedelsverket.



Bayer AB, Box 606, 169 26 Solna, tel 08-580 223 00