

Xofigo® beställning – lokala kontaktuppgifter

Sjukhus:

Leveransadress:

.....

Fakturaadress:

.....

Ansvariga beställare

Nukleärmedicin: Namn:.....TEL:.....

Namn:.....TEL:.....

Namn:.....TEL:.....

Ansvariga fysiker: Namn:.....TEL:.....

Namn:.....TEL:.....

Ansvariga onkologer: Namn:.....TEL:.....

Namn:.....TEL:.....

Ansvariga onkolog Namn:.....TEL:.....

sjuusköterska: Namn:.....TEL:.....

Namn:.....TEL:.....

Patienten får sin behandling på:


Av:

Xofigo® beställning – flödesschema

Leverans (veckodag/veckodagar):

Behandlingsdag/-dagar:

Beställ i ordersystemet senast:




Registrera dig som ny kund

1. Öppna <https://xofigo.bayer.com>
2. Klicka på *New user – I would like to register.*
3. Fyll i namn, kontaktuppgifter och om ni har särskilda önskemål om leveransen.
Tänk på att lämna en mejladress som du använder då leveransinformation kommer dit.
4. Klicka på *Send data.*
5. Du får sedan invänta ett svar med användarnamn och password som du skall ändra första gången du är inloggad i systemet.

Logga in i ordersystemet och lägg en beställning

1. Logga in genom att fylla i *Username* och *Password*.
2. På sidan kan du nu genom "drag and drop-menyn" kontrollera dina uppgifter, licens och tidigare order t.ex.
3. Klicka på *New commercial order* och sedan på *Select customer*.
4. Kontrollera att uppgifterna stämmer angående leveransadress (*Ship to*) och fakturaadress (*Sold to*).
5. Skriv in behandlingsdag (*Planned date of treatment*).
6. Fyll i *Customer PO Number*, vilket kan vara densamma som *Patient ID* (se punkt 7). Detta fält kan även användas för egna anteckningar för uppföljning. Innehållet i detta fält kommer att visas i leveransdokumentationen samt i fakturan.
7. Fyll i *Patient ID*. Det är viktigt att detta fält innehåller ett unikt nummer. Ett exempel kan vara att skriva in patientens initialer samt födelsedatum, t.ex. "JJ251044", **Obs!** utan mellanslag, bindestreck samt utan märkning av behandlingstillfälle t.ex. **ej** "JJ251044-4". Detta unika *Patient ID* ska användas vid varje beställningstillfälle oavsett vilken behandling i ordningen det gäller.
8. Fyll i om beställningen gäller en ny (*First*) patient eller en vidare (*Follow-up*) behandling. Fyll även i patientens vikt i fältet *Patient weight*.
9. Tryck på *Save and validate* så räknar systemet automatiskt ut den nödvändiga dosen på behandlingsdagen.
10. Kontrollera leverans- och senaste ankomstdag.
11. Skicka in beställningen (*Submit order*).
12. Vid annullering av beställningen kontakta Xofigo hotline tel. +46 8 580 223 36 så fort som möjligt för att se om det går att stoppa leveransen.

SENAST DAGEN INNAN, FÖRE 9.00. Vi gör vad vi kan för att lösa situationen.



Frågor kring ordersystem, leverans, beställning och avbeställning

Xofigo Helpdesk

Öppet 8.00–16.00, måndag–fredag

08-580 223 36

order.xofigo@bayer.com

Har du frågor om Bayers läkemedel?

Ring oss: +46 8 580 223 00

Skicka oss ett mail: medinfo.scand@bayer.com

<https://pharma.bayer.se/kontakta-medicinsk-information>

Du kan rapportera en misstänkt biverkning med någon av Bayers produkter genom att kontakta oss.

E-post: PV.nordics@bayer.com

Telefon: 08-580 223 00

Administrering av Xofigo[®] (radium Ra-223-diklorid)¹

Xofigo är avsett för intravenös användning. Det ska administreras som långsam injektion (i allmänhet upp till 1 minut).

Den intravenösa katetern eller kanylen måste spolas med isoton natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvätska, lösning före och efter injektion av Xofigo.

Ytterligare anvisningar om användning av läkemedlet finns i avsnitt 6.6 och 12 av produktresumén.

Dosering

Dosregimen för Xofigo är 6 injektioner med en aktivitet på 55 kBq per kg kroppsvikt givna med fyra veckors mellanrum.

Avfallshantering av Xofigo[®] (radium Ra-223-diklorid)¹

Radium-223 är en kortlivad nuklid

- Halveringstid = 11,4 dagar

- Nedbrytning vid lagring är möjlig

Slutprodukt av nedbrytning är icke-radioaktiv

Pb-207

Vanlig nedbrytningstid vid lagring: 4-8 månader

- Efter 10 halveringstider har aktiviteten nedbrutits till < 0,1% av sitt ursprungliga värde

Material som används i samband med förberedelse och administrering ska behandlas som radioaktivt avfall, förvaras på säkra områden

Kassera i lämplig kliniskt avfall efter lämplig nedbrytningstid vid lagring, i enlighet med lokala föreskrifter och sjukhusrutiner

Extravasering

Det är mycket låg risk för extravasering/perivenös administration av relevanta mängder av Xofigo när normala rutiner för administration följs. Om det trots allt sker så är det utifrån tillgängliga prekliniska studier inte förväntat att några allvarliga biverkningar uppkommer. Inga signifikanta biverkningar på grund av extravasering har rapporterats i kliniska studier.

I händelse av extravasering rekommenderas följande åtgärder:

- Avlägsna inte kanylen
- Följ generella standardprocedurer för hantering av extravasering av radiofarmaka
- Om möjligt, flusha långsamt ca 10–20 ml av isoton koksaltlösning genom kanylen
- Håll därefter armen i högläge
- Tillför värme till extravaseringsområdet för att främja kärlutvidgning (detta påskyndar resorption till blodbanan)
- Markera området med en penna
- Mät och fotografera området
- Informera ansvarig läkare om händelsen

Referenser:

Benjegerdes KE, Brown SC, Housewright CD. Focal cutaneous squamous cell carcinoma following radium-223 dichloride extravasation. Proc (Bayl Univ Med Cent). 2017;30(1):78-79.

Data on File. Xofigo® Radiation Safety GCPD Radiopharm reference statement 10 Information on extravasal administration Version 1.0 NIST2015. Bayer. November 2013.

Data on File. Investigator's Brochure BAY 88-8223. Bayer. June 2023.

Oyen W, Sundram F, Haug A, et al. Radium-223 dichloride (Ra-223) for the treatment of metastatic castration-resistant prostate cancer: optimizing clinical practice in nuclear medicine centers. Journal of Oncopathology. 2015;3:1-25.

Anteckningar



Handwriting practice lines consisting of 25 horizontal dotted lines.